

Cod Classe	Classe Trattamento Paziente	Sottoclasse	Tetto mensile prescrivibilità strisce reattive per glicemia ai sensi della normativa vigente regionale (D.g.r. n. 8678 del 9 aprile 2002)
1	Insulinico intensivo (basal-bolus o con microinfusore)		
	1.1	In terapia insulinica basal-bolus	175/mese
	1.2	In terapia con microinfusore, con diabete pregestazionale in gravidanza e soggetti con età inferiore a 18 anni	175/mese
	1.3	Bambini con età inferiore a 6 anni	175/mese
	1.4	Che iniziano il trattamento insulinico	175/mese per 3 mesi
	1.5	Con diabete di tipo 2 in terapia insulinica basalbolus in condizioni di controllo glicemico stabile	175/mese. La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo
	1.6	In condizioni di squilibrio glicemico o in presenza di malattie intercorrenti, per un periodo limitato alla durata dell'evento	Prevedere il Piano Terapeutico temporaneo inferiore all'anno La quantità massima è 300/mese, La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo
	Insulinico non intensivo o in trattamento combinato con farmaci con insulinici orali o iniettivi		
	2.1	In trattamento combinato con sola insulina basale (1 iniezione die)	75/mese
	2.2	In terapia insulinica basale o combinata che presentano un rischio elevato di ipoglicemia o conseguenze potenzialmente gravi dell'ipoglicemia (coronaropatia, vasculopatia cerebrale, retinopatia proliferante) e soggetti che svolgono professioni che espongono a un rischio di conseguenze gravi in caso di ipoglicemia (autisti, piloti, gruisti, lavoratori su impalcature, ecc.)	100/mese

	2.3	Che iniziano la terapia insulinica/1 iniezione al giorno	100/mese per 3 mesi
	2.4	In trattamento con insulina 2 volte al giorno	100/mese
	2.5	In trattamento con insulina 3 volte al giorno	125/mese
	2.6	In condizioni di squilibrio glicemico o in presenza di malattie intercorrenti, per un periodo limitato alla durata dell'evento	Prevedere il Piano Terapeutico temporaneo inferiore all'anno La quantità massima è 300/mese, La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo
Con ipoglicemizzanti orali secretagoghi che possono causare ipoglicemia			
	3.1	In condizioni di controllo glicemico stabile	25/mese
	3.2	Che presentano un rischio elevato di ipoglicemia o conseguenze potenzialmente gravi dell'ipoglicemia (coronaropatia, vasculopatia cerebrale, retinopatia proliferante) e soggetti che svolgono professioni che espongono a un rischio di conseguenze gravi in caso di ipoglicemia (autisti, piloti, gruisti, lavoratori su impalcature, ecc.)	25/mese
	3.3	Alla diagnosi e periodicamente, soprattutto quando viene modificata la terapia, in condizioni cliniche particolari	25/mese
	3.4	In condizioni di squilibrio glicemico o in presenza di malattie intercorrenti, per un periodo limitato alla durata dell'evento	Prevedere il Piano Terapeutico temporaneo inferiore all'anno La quantità massima è 300/mese, La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo
Dietetico e/o con farmaci che non causano ipoglicemia			
	4.1	Fase iniziale del trattamento e periodi di compenso precario	25/mese

	4.2	Fasi di buon compenso	25/trimestre
	4.3	In condizioni di squilibrio glicemico o in presenza di malattie intercorrenti, per un periodo limitato alla durata dell'evento	Prevedere il Piano Terapeutico temporaneo inferiore all'anno La quantità massima è 300/mese, La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo
Paziente con diabete gestazionale			
	5.1	in trattamento dietetico	175/mese. La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo
	5.2	in trattamento insulinico	175/mese. La quantità massima non deve essere esposta in fase di prescrizione ma deve essere applicato il controllo se viene superato il quantitativo